

Algoritmo de Atención para la persona con sospecha de exposición al virus de la rabia por animales silvestres



Agresión o contacto por Reservorio Silvestre:
Murciélago, zorro, zorrillo, coyote, lince, puma, coatí, mapache, etc.

NOTIFICACIÓN INMEDIATA¹
(<24 Horas)




Los roedores NO transmiten la rabia



ATENCIÓN MÉDICA DE LA(S) HERIDA(S) O ZONA ANATÓMICA DE CONTACTO:

1. Lavar inmediatamente con abundante jabón y agua a chorro durante 15 minutos.
a) Para la atención de mucosas, aplicar irrigación profusa con solución fisiológica durante 5 minutos.
 2. Desinfectar la herida con solución antiséptica o viricida.
 3. Previa valoración, indicar la aplicación de antibiótico(s), analgésico(s), antiinflamatorio(s) y otros biológicos, así como el abordaje de la herida.
- En pacientes politraumatizados con **Urgencia Calificada**, emplear los recursos disponibles para su atención y valorar su referencia inmediata a un segundo o tercer nivel para su valoración integral.



- De presentar **cuadro clínico neurológico compatible al diagnóstico de rabia humana**, no se deberá aplicar **biológicos antirrábicos humanos** en ningún nivel de atención médica pública o privada.
 - **VAH* (Vacuna Antirrábica Humana):** NO está indicada si el paciente recibió **profilaxis completa dentro de los 3 meses previos** (solo atención de la herida). Si el tiempo entre la aplicación de la última dosis de VAH y la fecha de exposición al virus de la rabia es mayor a 3 meses, deberá realizar titulación de anticuerpos del paciente agredido antes de decidir la aplicación de VAH. **El esquema de 4 dosis se aplica en pacientes sin antecedente vacunal, con riesgo leve o grave, sin importar el tiempo transcurrido desde la fecha de exposición al virus rábico.**
 - **IgAH** (Inmunoglobulina Antirrábica Humana):** Se aplica por infiltración peri e intralesional, simultánea a la primera dosis de VAH o hasta el día 7 posterior a ésta, en pacientes de riesgo grave que no cuentan con antecedentes previos de inmunización con VAH y en pacientes inmunocomprometidos. Si existiera sobrante del biológico, se aplicará vía IM en el glúteo. En caso de requerir afrontamiento con suturas retrasar por lo menos una hora posterior a la aplicación del biológico.
1. De acuerdo al Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Rabia Humana.
- En todo resultado de reservorio positivo por laboratorio a rabia, así como agresiones por animales silvestres o contacto con animales de interés económico, se deberá iniciar acciones de control de foco rábico.

[gob.mx/salud/cenaprece](https://www.gob.mx/salud/cenaprece)



Gobierno de México

Salud
Secretaría de Salud

Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional

Marina
Secretaría de Marina



IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PEMEX
POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades